

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 13-5-65 361268

PUBLICATION MENSUELLE

ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P. : LYON 9.430-12

TÉLÉPHONE 37-20-56

ABONNEMENT ANNUEL

15 NF

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région Bulletin N° 56 de Mai 1965 - 12 Mai 1965

Page 21

VIGNE

AVERTISSEMENTS

MILDIU et BLACK-ROT - Le renouvellement du 1er traitement fongicide, dans les seules situations où il a déjà été appliqué, s'effectuera dans les délais suivants :

- Roannais et moitié est de la Circonscription (à l'est d'une ligne St. Trivier de Courtes - Bourg - Bourgoin - St. Marcellin - Die - La Motte Chalençon) : d'urgence en raison des fortes précipitations des 4 et 5 mai.
- Dans les autres régions : de 12 à 16 jours après la première application suivant la rapidité de la croissance.

TORDEUSE DE LA GRAPPE - Seules les recommandations du bulletin précédent relatives à la Pyrale restent valables, eudémis et cochyli ne s'étant pas encore manifestées.

INFORMATIONS

OIDIUM - Sur cépages sensibles, il y aura intérêt à commencer la lutte dès maintenant.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

TAVELURES - 1. Dans les régions montagneuses de l'est et du Nord-Ouest de la Circonscription, si aucun traitement n'a été effectué depuis le 5 mai, une application devra être faite d'urgence. Si un traitement a été effectivement appliqué depuis le 5 il devra être renouvelé au bout de 12 jours.

2. Dans les autres régions tout traitement antérieur au 9 mai devra être renouvelé avant le 17, date probable d'apparition de nouvelles taches.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - Le vol des insectes printaniers reste trop faible pour justifier un traitement, même en pépinières.

INFORMATIONS

ANTHRACNOSE DU CERISIER - En toutes régions, un premier traitement devra être appliqué dès réception sur toutes variétés. Les produits cupriques sont déconseillés en raison des risques de brûlures ; la plupart des fongicides de synthèse sont efficaces (doguadine, manèbe, dichlone, oxyquinoléate de cuivre, phaltane, captane, thirame).

LYDA DU PECHER - Surveiller l'apparition de cette fausse chenille verte qui dévore rapidement le feuillage et lui appliquer le cas échéant un des produits efficaces contre les pucerons.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux

A. PITHIoud

Le Contrôleur Chargé des Avertissements
Agricoles

P. LATARD

7407